

建議詢問醫生的問題



- 我還能做些什麼以加強和保護我的骨骼？
- 我上一次的骨密度掃描結果如何？
- 我的骨密度掃描結果或 T - 評分意味著什麼？
- 在目前的治療下, 我的骨骼有沒有變強？
- 在用藥後, 我的喉嚨常有燒灼感, 或者嘴裡有酸味。還有沒有別的選擇？
- Prolia®是否適合我？

您準備好強健您的骨骼了嗎？ 跟醫生商討看看Prolia® 是否適合您。

適應症

Prolia®是一種用於治療女性停經後骨質疏鬆症的處方藥物，適用於有高骨折風險，或不能使用另一種骨質疏鬆症藥物，或使用其他骨質疏鬆症藥物效果不佳的女性。
Prolia®是一種增加骨量的處方藥，用於患有骨質疏鬆症，並具高骨折風險的男性。

重要安全資訊

請勿使用 Prolia®，如果您： 有低血鈣；已懷孕或計劃懷孕(因為Prolia®可能會傷害您的胎兒)；對 denosumab 或 Prolia® 的任何成份過敏。

對於 Prolia®，我最應該知道的重要資訊是甚麼？

如果您接受Prolia®，就不應該接受XGEVA®。Prolia®與XGEVA® (denosumab) 所含的藥物相同。

Prolia®可引致嚴重副作用：

Prolia®使用者曾發生**嚴重的過敏反應**。如果您有嚴重過敏反應的任何症狀，包括：低血壓；呼吸困難；喉嚨緊繃；面部、嘴唇或舌頭腫脹；皮疹；瘙癢；或蕁麻疹，應立即致電醫生或到就近的急診室。

低血鈣 (低血鈣症)。Prolia®可能會降低您血液中的鈣水平。如果您血鈣低，更可能會在治療期間惡化。在接受 Prolia®前，必須先治療您的低血鈣症。按醫生囑咐服用鈣片和維他命 D，以助預防低血鈣症。

可能會發生**嚴重的下顎骨問題 (骨壞死)**。在您開始Prolia®治療前，醫生應替您檢查口腔，並可能會讓您去看牙醫。您在接受 Prolia®治療期間，務必保持良好的口腔護理。



異常的大腿骨折。某些人的大腿骨會出現異常骨折。骨折的症狀包括髖部、腹股溝或大腿出現新的或異常的疼痛。

停止、遺漏或延遲使用 Prolia®後，骨骼斷折的風險增加，包括脊柱骨折。於開始接受 Prolia®治療前，請與醫生商討。在您停止 Prolia®治療後，或如果遺漏或延遲使用劑量，您發生骨骼斷折，包括脊柱骨折的風險會增加。如果您的脊柱曾有過骨折，脊柱發生多於一處骨折的風險，亦隨之增加。在未與醫生商討前，切勿停止、遺漏或延遲使用 Prolia®。如果您已停止 Prolia®治療，請與醫生商討您可以服用的其他藥物。

嚴重感染可能會發生在您的皮膚、胃下方(腹部)、膀胱或耳朵。Prolia®使用者也可能會更常發生因感染引起的心臟內膜炎(心內膜炎)。您可能要送院治療。

Prolia®是一種藥物，可影響您身體抵抗感染的能力。免疫系統減弱，或使用影響免疫系統藥物的人士，其發生嚴重感染的風險可能會增加。有報告指出，曾出現**皮膚問題**，如皮膚發炎(皮炎)、皮疹和濕疹。

骨骼、關節或肌肉疼痛。部分 Prolia®使用者出現嚴重骨骼、關節或肌肉疼痛。

在接受 Prolia®前，將您所有的健康狀況告訴醫生，包括如果您：

- 服用 XGEVA® (denosumab) 藥物
- 血鈣低
- 不能每天服用鈣片和維他命 D
- 接受過副甲狀腺或甲狀腺 (位於頸部的腺體) 手術
- 被告知您的胃或腸道難於吸收礦物質 (吸收不良症候群)
- 有腎臟問題或接受洗腎
- 正在服用能降低血鈣水平的藥物
- 計劃進行牙科手術或拔牙
- 已懷孕或計劃懷孕

育齡女性：

- 開始 Prolia®治療前，您的醫療保健提供者應該替您進行妊娠測試。
- 您應該在 Prolia®治療期間，並在接受最後一劑 Prolia®後，至少 5 個月內，使用有效的方法來控制生育(避孕)。
- 如果您在使用 Prolia®期間懷孕，請立即告知醫生。
- 正在授乳或計劃授乳

Prolia®可能會有哪些副作用？

尚未知悉，長時間使用 Prolia®會否引致骨折癒合緩慢。對於停經後接受骨質疏鬆症治療的女性，Prolia®最常見的副作用為背部疼痛、手臂和腿部疼痛、高膽固醇、肌肉疼痛、膀胱感染等。對患有骨質疏鬆症的男性，Prolia®最常見的副作用為背部疼痛、關節疼痛和普通感冒 (流鼻水或喉嚨痛)。上述非為 Prolia®的全部副作用。請致電醫生，查詢有關副作用的醫療建議。

FDA 鼓勵您向其報告處方藥物的不良副作用。

請瀏覽www.fda.gov/medwatch，或致電1800-FDA-1088。

請參閱 Prolia®完整處方資訊及用藥指南。

